Gestione del follow up del paziente arruolato in SIUrO PRIAS ITA

Il follow up dei pazienti arruolati è affidato al centro a cui afferisce il paziente ed è periodicamente controllato dal centro coordinatore.

Il centro si deve collegare al sito www.prias-project.org e registrarsi utilizzando le credenziali fornite dal centro coordinatore al momento dell'adesione a SIUrO – PRIAS – ITA.

Inserendo l'identificativo del paziente è possibile recuperarne la scheda.

Si può ora aggiungere una nuova visita e includere le informazioni previste per quel controllo (PSA e/o DRE e/o biopsia).

Le raccomandazioni del sistema possono essere:

- 1. "Continue on active surveillance"
 - Il paziente può proseguire il programma osservazionale
- 2. "PSA DT > 10 years*, Extra biopsy to check pathologic status (not if already performed during the past year of follow up)"

Il messaggio appare quando il PSA Doubling Time inferiore a 10 anni. Se nei 12 mesi precedenti il paziente non ha effettuato la biopsia, è opportuno programmargliela.

In alternativa alla extra biopsia, può essere prescritta la Risonanza Magnetica multiparametrica e, a seguire, eventuale biopsia delle lesioni sospette. Se il paziente si è sottoposto a biopsia nei 12 mesi precedenti, è opportuno attendere i successivi controlli del PSA.

3. "Repeat biopsy: 1 or 2 cores with PC and GPS 3+3=6 or less* - Definitive curative treatment"

La rebiopsia ha evidenziato un numero dei campioni positivi superiore a 2: in assenza di Risonanza Magnetica multiparametrica basale, si interrompe la sorveglianza attiva e si indirizza il paziente al trattamento attivo.

La rebiopsia ha evidenziato Gleason Score > 3+3, si interrompe la sorveglianza

La rebiopsia ha evidenziato Gleason Score > 3+3, si interrompe la sorveglianza attiva e si indirizza il paziente al trattamento attivo.

^{*} il messaggio è arancione ad indicare lo scostamento dai criteri che permettono di proseguire la sorveglianza attiva.